

عقیم کردن سگ های ماده اغلب با دو هدف انجام می شود:

1- متناسباً زوری را یریگولاج و هدامگسندومنه میقع

2- فیفخته و نادمخته و مجر یاهروموت و مجر یانوفع یاه یرامیب و منیس یاهروموت دننام ییاه یرامیب زوری را یریگشیب یراردا طاسوت یراذگت مللع دننام بولطم از یاهراتفر یخری ندری نیب ز و عرض و ت باید دننام ییاه یرامیب م تلاء

جراحی عقیمی سگ و گربه یکی از متداول ترین جراحی های است که به صورت انتخابی (اختیاری) انجام می شود. در طی این جراحی حفره شکمی باز می شود و از این نظر با وجود متداول بودن انجام آن رعایت استریلیتی الزامی بوده و می بایست در محیط مناسب و توسط افراد با تجربه کافی انجام گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

جراحی عقیمی از نظر میزان درد در گروه جراحی های با درد متوسط قرار می گیرد و تحت بی هوشی عمومی قابل انجام است. اغلب سگ ها و گربه ها حداکثر 3 ساعت پس از اتمام جراحی کاملاً به هوش آمده و می توانند راه بروند. فعالیت حیوان ممکن است تا 2 روز کمی کاهش پیدا کند ولی معمولاً از روز سوم درد تنها در صورت لمس محل بخیه ایجاد می شود. معمولاً داروی ضد درد مخصوص پس از جراحی در اختیار صاحب دام قرار می گیرد تا در صورت لزوم از آن به میزان گفته شده استفاده شود. در غیر این صورت باید از به کار بردن داروهای مسکن متداول (مانند استامینوفن و آسپرین) بدون مشورت با دامپزشک جداً خودداری نمود. بخیه ها اغلب 2 هفته پس از جراحی کشیده می شوند و تا زمان کشیده شدن بخیه ها باید از خیس و یا آلوده شدن آنها جلوگیری نمود که معمولاً این کار با استفاده از چسب های مخصوص و یا بانداژ انجام می شود. در صورت تمایل می توان از بخیه های جذب شونده که نیاز به کشیدن ندارند استفاده نمود ولی ریسک عفونت در این بخیه ها بالاتر است و بیشتر مناسب سگها و گربه های خیابانی می باشد که پس از جراحی رها سازی شده و امکان دو هفته نگهداری و کشیدن بخیه وجود ندارد.

با توجه به اینکه این جراحی می تواند از بروز بیماری های کشنده ای مانند عفونت رحمی (پیومتر) و تومورهای سینه جلوگیری کند اغلب توصیه می شود در صورتی که تمایل به تکثیر نسل حیوان خانگی خود ندارید در سنین کمتر از 6 ماهگی و قبل از رسیدن به بلوغ حیوان خانگی خود را عقیم نمایید تا با جلوگیری از رشد بافت سینه، احتمال بروز تومورهای سینه را به حداقل ممکن کاهش دهید.

جراحی عقیمی سگ و گربه ماده در صورتی که قبل از سن 6 ماهگی انجام شود ریسک بروز تومور سینه را به 0/8٪ کاهش می دهد در حالی که عقیم سازی بعد از یک بار فعلی ریسک را به 8٪ کاهش داده و عقیمی بعد از دو بار فعلی تاثیر بسیار کمی در کاهش خطر سرطان سینه خواهد داشت. بنابر این هرچه زودتر عقیم سازی انجام شود از نظر سلامتی سگ یا گربه بهتر خواهد بود. البته این جراحی در سن کمتر از 5 ماه نباید انجام شود چون می تواند منجر به عوارضی نظیر رشد قدی بیشتر از نرمال و یا، بی اختیاری ادرار شود.

تصاویر زیر مربوط به جراحی عقیم نمودن سگ ماده در کلینیک دامپزشکی دکتر مکرم می باشد.

جراح: دکتر سارا مکرم (متخصص جراحی از دانشگاه تهران)

کمک جراح: دکتر ماهان بی طرف



